

Toepassing

Bondronat tabletten zijn geïndiceerd voor de preventie van skeletal events (skeletgebeurtenissen; pathologische fracturen, botcomplicaties die radiotherapie vereisen of chirurgie) bij patiënten met borstkanker en botmetastasen.

Wat te doen bij vergeten of uitbraken

Als u per ongeluk een dosis mist, neem dan niet meerdere tabletten op één dag om de vergeten dosis in te halen. Neem de volgende dag gewoon één tablet zoals gebruikelijk en raadpleeg eventueel uw behandelend arts.

Na het slikken van Bondronat kreeg ik last van brandend maagzuur. Wat kan ik doen?

Gaat u rustig rechtop zitten, vermijd vet voedsel, vermijd alcohol en stop met roken. Een glaasje kraanwater kan verlichting geven. Wanneer u een bijwerking ervaart, raadpleeg dan de bijsluiter. Waarschuw uw behandelend arts wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter.

INNAMEDADVIES

Bondronat 50mg tablet

Deze folder wordt u aangeboden door Roche Nederland B.V.

Roche Nederland B.V.

Beneluxlaan 2a
3446 GR Woerden
tel. 0348 - 43 80 61

email info@roche.nl
www.roche.nl



Inleiding

U heeft een behandeling met Bondronat® voorgeschreven gekregen. Deze folder kan niet het professionele advies van uw behandelend arts en verpleegkundige vervangen. Lees de informatie zorgvuldig voordat u met de behandeling begint. Als u nog andere vragen heeft, neem dan contact op met uw behandelend arts of verpleegkundige. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt.

Bondronat

De werkzame stof is ibandroninezuur, ook wel ibandronaat genoemd. Het middel is beschikbaar als tablet (1x daags 50mg) maar kan ook als infuus (1x per 3-4 weken 6mg) worden gegeven.

50 mg tablet, hoe in te nemen

De filmomhulde tabletten hebben een langwerpige vorm en een witte tot gebroken witte kleur.

De tablet moet iedere dag **in zijn geheel** worden doorgeslikt met een glas **kraanwater** op een **nuchtere maag, 30 minuten vóór uw ontbijt**. U mag niet meer gaan liggen (tot 60 minuten na inname).

Neem de tablet nooit in met melk of andere zuivelproducten. Om te voorzien in uw behoefte aan calcium is het belangrijk dat u gedurende de rest van de dag wel voldoende zuivelproducten inneemt. Indien u een te hoog calciumgehalte in uw bloed heeft of indien uw nieren niet of niet voldoende functioneren is het belangrijk dat u tijdens de behandeling goed drinkt.

Mogelijke bijwerkingen

Het kan voorkomen dat mensen die de tablet slikken last krijgen van brandend maagzuur. Soms treedt een verlaging op van de hoeveelheid calcium in het bloed (hypocalciëmie). Wanneer u een bijwerking ervaart, raadpleeg dan de bijsluiter. Waarschuw uw behandelend arts wanneer bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter. U kunt achterin dit boekje notities maken over eventuele bijwerkingen die u ervaart.

Bewaren

Bewaar de tabletten in de oorspronkelijke verpakking en houd ze buiten het bereik van kinderen. Niet gebruiken na de op de strip en buitenverpakking vermelde uiterste gebruiksdatum.

Inname samen met andere geneesmiddelen

Licht uw dokter of apotheker in als u andere (zelfzorg) geneesmiddelen gebruikt of wanneer u voedingssupplementen gebruikt. Bondronat kan, mits niet gelijktijdig ingenomen met deze middelen, gewoon gebruikt worden naast hormoontherapie, chemotherapie, middelen tegen hoge bloeddruk, antibiotica en pijnstillers. Indien u niet-steroidale ontstekingsremmers gebruikt (NSAID's, zoals aspirine of ibuprofen), pas dan goed op met het gebruik van Bondronat. Beide therapieën kunnen irritatie van de maag en de darm veroorzaken.

